

CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur
entre 2°C et 8°C

ou à une température
inférieure à 25°C en dehors
du réfrigérateur pendant 18 mois
si la date de péremption
n'est pas dépassée.

À conserver dans l'emballage
d'origine à l'abri de la lumière.

!! Pensez à vérifier !!
● ● la date de péremption ● ●



Hôpitaux La Rochelle Ré Aunis
Centre Hospitalier de Rochefort
Centre Hospitalier de Marennes
EHPAD «Val de Gères» Surgères
Hôpital de l'Île d'Oléron

1 rue du Docteur Schweitzer
17019 La Rochelle Cedex 1
Standard > 05 46 45 50 50

www.ch-larochelle.fr |    

Établissements membres du **Groupement Hospitalier de Territoire Atlantique 17**



GLUCAGEN® KIT



INDICATIONS :

Hypoglycémies sévères survenant chez
une personne diabétique ayant perdu
connaissance ou en incapacité
à se resucrer seule.

L'injection est pratiquée par une tierce
personne, ce qui nécessite
que l'entourage soit informé
et formé au préalable.

MODE D'ADMINISTRATION

APRÈS RECONSTITUTION DU PRODUIT, L'INJECTION SE FAIT
SOUS LA PEAU OU DANS LE MUSCLE

QU'EST-CE QUE GLUCAGEN® KIT 1MG/ML ?

= 1 mg Glucagon (hormone naturelle hyperglycémiant qui a une action contraire à celle de l'insuline).

Poudre et solvant pour solution injectable en seringue pré remplie qui doit être administrée par une tierce personne.

Son action est transitoire, une collation sucrée est nécessaire dès la reprise de conscience.

POSOLOGIE :

Adulte : administrez la totalité de la seringue (trait 1/1 ml de la seringue).

Enfant de plus de 25 kg ou ayant plus de 6-8 ans : administrez la totalité de la seringue (trait 1/1 ml de la seringue).


Enfants de moins de 25 kg ou ayant moins de 6-8 ans : administrez la moitié de la seringue (trait 1/2 ml de la seringue).



1 Retirer la capsule orange du flacon de poudre.



2 Enlever le capuchon de l'aiguille.



3 Piquer l'aiguille de la seringue dans le bouchon du flacon de poudre.



4 Injecter toute l'eau dans le flacon de Glucagon.



5 La poudre se dissout instantanément. Généralement, il n'est pas nécessaire d'agiter.



6 Prélever la solution de Glucagon avec la seringue.

Pour les jeunes enfants (moins de 25 kg), ne prélever que la moitié de la solution



7 Et chasser l'air.



8 Injecter sous la peau ou dans un muscle (cuisses, bras, ventre, fesses...) même à travers les vêtements.



9 Donner une collation sucrée dès la reprise de conscience (ex. brique de jus de 20 cl ou morceau de sucre).